

Tillykke!
VED AT BRUGE



**HAR DU BESKYTTET
DIG SELV**

— mod —

KØNS
sygdomme



*Pas på DIG selv
-brug kondom*

KLAMYDIA

{ BAKTERIE }

HVORDAN SMITTER KLAMYDIA?:


- Smitter ved sex uden brug af kondom
- Eller ved at kønsorganerne kommer i tæt berøring.

SYMPTOMER:

- Udflåd fra urinrøret
- Øget udflåd fra skeden
- Sviende smerter, når man tisser
- Få oplever blødning fra skeden efter sex
- Efter analsex kan der komme infektion i tarmen, som gør at man kan få udflåd og diarre

**HVORDAN TESTES
MAN FOR KLAMYDIA?**

**MAN TESTES VED
URINPRØVE**



GONNORÉ

{ BAKTERIE }

HVORDAN SMITTER GONORRÉ?:

- Smitter ved sex uden brug af kondom
- Og ved oralsex – men ikke ved kys

SYMPTOMER HOS KVINDER:

- Kraftigt gulligt udflåd fra skede eller urinrør
- Sviende smerter, når man tisser
- Evt. pletblødninger.


SYMPTOMER HOS MÆND:

- Kraftigt gulligt udflåd fra urinrør
- Sviende smerter, når man tisser
- Evt. hævelser og smerter i pungen

OBS! GONORRÉ GIVER OFTE INGEN SYMPTOMER.

**HVORDAN TESTES
MAN FOR GONNORÉ?**

**MAN TESTES VED
URINPROVE**



SYFILIS

— { BAKTERIE } —

HVORDAN SMITTER SYFILIS?:

- Smitter ved sex uden brug af kondom
- Og ved oralsex

**HVORDAN TESTES
MAN FOR SYFILIS?**

**MAN TESTES VED
BLODPRØVE**

SYMPTOMER OPTRÆDER I 3 STADIER:

1. stadie: Der opstår et sår, der ikke er ømt. Det kan derfor være svært at opdage, hvis det sidder gemte steder. Såret forsvinder efter 3-6 uger.
2. stadie: Der kan komme udslæt på kroppen og influenzasymptomer 6-8 uger efter smitten.
3. stadie: Der kan opstå livsfarlige symptomer som f.eks. betændelse i hjernen og rygmarven, og man kan blive lammet. Dette sker 5-20 år efter smitten.



HIV

—{VIRUS}—

HVORDAN SMITTER HIV?:

- Smitter via blod
- Smitter ved sex uden brug af kondom
- HIV smitter ikke ved kys og berøring


SYMPTOMER:

Det er kun ca. halvdelen, der oplever de første symptomer på HIV som kan optræde ca. 14 dage efter smitte og kan være:

- Feber, halsbetændelse, hævede lymfeknuder, mavesmerter, svamp i munden, hovedpine, muskel- og ledsmerter, røde pletter, knopper. Disse symptomer forsvinder efter 2-4 uger.
- Efter nogle år kommer der nogle infektioner og sygdomme, som viser sig ved svamp i munden, diarré, vægttab m.m.

**HVORDAN TESTES
MAN FOR HIV?**

**MAN TESTES VED
BLODPRØVE**



HERPES

{VIRUS}

HVORDAN SMITTER HERPES?:

- Smitter ved sex uden brug af kondom
- Smitter ved oralsex
- Herpes kan også smitte ved berøring og kys


OBS! MAN KAN HAVE HERPES I LANG TID, UDEN AT HAVE SYMPTOMER

SYMPTOMER:

- Smerter, hævelse, rødme, kløe og svie på kønsdelene efterfulgt af små væskefyldte blærer, der brister og bliver til sår. Udbruddet kommer ofte 1 uge efter smitte og varer i ca. 2 uger.
- Det første udbrud kan medføre hovedpine, ondt i halsen, let feber og muskelsmerter.

**HVORDAN TESTES
MAN FOR HERPES?**

**MAN TESTES VED
BLODPRØVE OG
PODNING FRA
SÅRET**



KONDYLOMER/ KØNSVORTER

{VIRUS}

HVORDAN SMITTER KONDYLOMER?:

- Smitter ved samleje i skeden og analsex uden brug af kondom
- Smitter kun sjældent ved oralsex

SYMPTOMER HOS MÆND:


- Vorter under forhuden, på penishovedet, i/omkring urinrøret og endetarmen

SYMPTOMER HOS KVINDER:

- Vorter på kønslæberne, ved skedeåbningen, ved mellemkødet, på klitoris, i/omkring endetarmen, i skeden eller på livmoderhalsen

**HVORDAN TESTES MAN
FOR KØNSVORTER?**

**MAN TESTES VED, AT
SUNDHEDSPERSONALET
KIGGER PÅ VORTERNE OG
TAGER EN PROVE MED EN
VATPIND**



**SEX ER
GODT!**

**HVIS DU BRUGER
KONDOM, SÅ SLIPPER
DU FOR AT BEKYMRE
DIG OM KONS-
SYGDOMME.**

**ER DU I TVIVL OM DU ER SMITTET MED EN KONS-
SYGDOM, SÅ KONTAKT SUNDHEDSCENTERET ELLER
SYGEHUSET, SÅ DU KAN BLIVE TESTET.**

**KONDOM ER DEN ENESTE PRÆVENTIONSFORM DER
BESKYTTER MOD BÅDE KONSSYGDOMME OG
UØNSKET GRAVIDITET**



*Pas på DIG selv
-brug kondom*